

## Caratteristiche Tecniche

**Trustee 450 PFnPE** è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

## Dosi e modalità di impiego

Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

## Campi d'impiego

Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: agrumi, pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, vite e olivo (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 4.8 l/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).

Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: drupacee (albicocco, ciliegio, nettarine, pesco e susine), mandorlo, actinidia, piante floricole e ornamentali, forestali.

Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia): orticole (carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota, patata), mais (solo interfila; non usare prima della raccolta), rosa. Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, frumento, orzo, segale, avena, mais, prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.



### Trustee 450 PFnPE

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.

### Azienda di confezionamento e distribuzione

Vebi Istituito Biochimico s.r.l.  
Via Desman 43  
35010 Borgoricco (PD), Italia  
Tel. (+39) 049 9337111  
Fax (+39) 049 5798263  
www.vebi.it

### Registrazione

Registrazione Ministero della Salute  
N. 14947 del 13/06/2011

### Aspetto, colore e odore

Liquido di colore giallo arancione dall'odore caratteristico

### Composizione

GLIFOSATE ACIDO puro (da sale isopropilamminico)	37,3 g (=450 g/L)
Coformulanti	q.b. a 100 g

## Consigli d'uso

I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.

I migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso, cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento. È sconsigliato effettuare il diserbo se c'è rischio di pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c'è il rischio di gelate.

Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse.

L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe essere inefficace. Le temperature medie e l'alta umidità facilitando la vegetazione delle infestanti favoriscono l'esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.

## Avvertenze

Intervenire solo su infestanti in attiva crescita.

Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe essere inefficace.



## Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone
01754	Flacone 500 ml	24 pezzi

## Prodotti Correlati

Codice	Descrizione Articolo
01838	Barbarian biograde 360 PFnPE